



UFI: 0V67-3W73-E20U-ME9P



Insecticides professionnels  
Utilisation professionnelle.

# PHEPRA

**INSECTICIDE A USAGE PROFESSIONNEL - PT18**  
**INSECTICIDE À LARGE SPECTRE POUR LE**  
**CONTRÔLE DES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS.**

**VAZOR® PHEPRA** est destiné à la lutte contre les insectes nuisibles rampants et volants en pulvérisation et brumisation à l'intérieur, par exemple dans les maisons, les entrepôts, les abris pour animaux, les installations industrielles, les bâtiments et espaces publics, y compris les zones de manipulation et de stockage des aliments, ainsi que les hôpitaux, et à proximité immédiate des bâtiments. Il peut être utilisé dans les locaux agricoles, les écuries, les élevages de poulets et de volailles, les élevages de bétail, les entrepôts de grains vides, les dépendances des fermes et les laiteries. Ainsi qu'en pulvérisation de surface dans les écuries occupées.

**VAZOR® PHEPRA** est efficace contre un large éventail d'insectes nuisibles commerciaux et résidentiels, notamment les fourmis (*Lasius niger*), les punaises de lit (*Cimex lectularius*), les blattes allemandes et orientales (*Blattella germanica* et *Blatta orientalis*), les coléoptères de la litière (*Alphitobius diaperinus*), les acariens rouges de la volaille (*Dermanysus gallinae*), les mouches telles que la mouche domestique (*Musca domestica*), la mouche des étables (*Stomoxys calcitrans*) et la mouche des cornes (*Haematobia irritans*), les moustiques (*Aedes aegypti* et *Culex pipiens*), les mites alimentaires (*Ephesia kuehniella* et *Plodia interpunctella*), les guêpes (*Vespa Germanica*) et les frelons européens (*Vespa crabro*).

**COMPOSITION: 1R-TRANS-PHÉNOTHRINE 10 % P/P (100 G/L)**  
**PRALLÉTHRINE 1 % P/P (10 G/L)**

Type de formulation :  
ZW (Mélange de suspension de capsule et d'émulsion concentrée)

# 1 Litre

Label Ref: MARCH 2023

Bien agiter avant emploi  
et protéger du gel

Toujours lire l'étiquette et la fiche  
technique avant utilisation du produit



INSECTICIDE A USAGE PROFESSIONNEL - PT18  
CONTRÔLE DES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS.

**MENTIONS DE DANGER et DÉCLARATION DE PRÉCAUTION**  
**AVERTISSEMENT**



**H332** Nocif en cas d'inhalation.

**H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

**P101** Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le récipient ou l'étiquette du produit.

**P102** Conserver hors de portée des enfants.

**P103** Lire l'étiquette avant utilisation.

**P261** Éviter de respirer les vapeurs/pulvérisations.

**P271** Utilisation uniquement à l'intérieur ou dans un endroit bien ventilé.

**P501** Élimination du contenu/conteneur dans une installation conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

**Lire toutes les instructions ci-jointes avant emploi**

**Dates de péremption : 2 ans à partir de la date de**

**fabrication sur le flacon**

**N° lot indiqué sur le flacon**

**1L**

**Responsable de la mise sur le marché :**

**JESMOND HOLDING AG**

Baarerstrasse 8 6300 Zug, (Suisse)

Tel. +43 1 368 51 85, e-mail: office@jesmond.com, https://www.jesmond.com/en/

**Instructions d'emploi:**

VAZOR PHEPRA détruit en quelques heures et dispose d'une activité résiduelle prolongée allant jusqu'à 12 semaines. L'activité résiduelle dépend de la surface sur laquelle le produit est appliqué et des conditions environnementales. Répétez l'application si nécessaire.

Envisager les principes de la lutte intégrée contre les nuisibles (IPM) pour éviter la résistance.

**Instructions de mélange :**

Bien agiter le récipient du produit avant son utilisation. Remplir à moitié le réservoir propre de l'équipement de pulvérisation avec la quantité d'eau nécessaire. Ajouter le bon volume de VAZOR PHEPRA. Remplir le réservoir de l'équipement de pulvérisation avec le volume manquant d'eau claire. Fermer le réservoir de l'équipement de pulvérisation et agiter. Si un délai s'écoule entre deux traitements, agiter à nouveau avant de réutiliser le produit.

Ne pas stocker la solution de pulvérisation préparée et utiliser la solution de pulvérisation mélangée prête à l'emploi dès que possible. Nettoyer l'équipement de pulvérisation à l'eau claire après le traitement.

Ne pas mélanger VAZOR PHEPRA avec d'autres produits (biocides ou désinfectants)

**Dosage général pour la pulvérisation :**

**50 ml pour 51 d'eau pour 100m<sup>2</sup> (50 ml/m<sup>2</sup>)**

\* La teneur en eau nécessaire peut varier en fonction de l'état de la surface et du matériel d'application.

Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur manuel, mécanique ou électrique approprié produisant un jet à grosses gouttelettes. Pulvériser uniformément sur toutes les surfaces en tenant la buse du pulvérisateur à environ 30 cm de la surface, en mouillant bien juste avant le point de ruissellement. Accorder une attention particulière aux fissures, aux crevasses, aux espaces morts et aux endroits où s'installent les insectes. Le produit ne doit pas être utilisé sur les vêtements ou le linge de lit (draps couvertures, couettes) ni dans les lits où dorment les nourrissons.

**Zones intérieures (insectes volants et rampants) :**

Dans les locaux à usage domestique ainsi que dans les zones occupées en permanence, telles que les services hospitaliers, les foyers résidentiels/ maisons de repos et de soins, les prisons et les zones où les humains et les animaux domestiques peuvent entrer en contact avec le produit pulvérisé, appliquer le produit uniquement pour traiter de manière locale/punctuelle ou les fissures et crevasses. Fermer toutes les portes et fenêtres avant de l'utiliser. Ne pas entrer pas dans la zone traitée pendant au moins 30 minutes après le traitement et après le séchage du produit. Bien aérer la zone traitée.

**Nids de guêpes et de frelons :**

Appliquer généreusement et directement sur le nid ou sur les trous d'entrée des nids cachés jusqu'à saturation du nid. Appliquez au crépuscule avec un équipement de pulvérisation et un équipement de protection appropriés.

**Fourmis (nid de fourmis) :**

Traiter une surface de 1 m<sup>2</sup> autour de l'entrée du nid et une bande de 10 cm sur les chemins des fourmis

**Punaises de lit :**

Appliquer dans les endroits préférés des insectes sous et sur les coins du matelas, sur la base et sous le lit, sous les tables de nuit, dans les fissures et les crevasses autour du lit.

**Locaux agricoles, écuries, hangars, porcherie, élevages de bovins, de chevaux, de poulets et de volailles, élevages de bétail, dépendances de la ferme et laiteries :**

Ne pas appliquer directement sur les animaux. Enlever les oeufs avant de pulvériser. Nettoyer les surfaces avant l'application et traiter sur surfaces sèches. Appliquer le produit sous forme de brouillard fin avec une pression moyenne ; traiter soigneusement les surfaces mais pas jusqu'à ruissellement. Faites particulièrement attention aux fissures, aux crevasses et aux endroits où les insectes s'installent.

**Traitements de barrière et périphériques :**

Créer une bande continue de 20 à 30 cm sans à-coup pour former une barrière efficace le long du périmètre. Pulvériser autour des portes, des fenêtres et des ouvertures, en prêtant une attention particulière aux voies de migration et aux zones où les insectes se cachent et s'installent habituellement. Ne pas laisser le produit se dessécher dans l'environnement ou dans les égouts. Ne

pas pulvériser jusqu'à ruissellement, ne pas appliquer dans ou autour des égouts, ne pas contaminer les plans d'eau ou les cours d'eau. Ne pas appliquer le produit en cas de vent fort ou de pluie battante.

**Intérieur - traitement spatial - nébulisation à froid et chaud :**

**Dosage:** 50 ml (à diluer dans 1 à 5 l d'eau) pour 500 m<sup>3</sup>.

La teneur en eau nécessaire peut varier en fonction du matériel d'application. L'application se fait au moyen d'équipements de brumisation thermique, d'équipements à ultra bas volume (ULV) générant un aérosol froid, de pulvérisateurs rotatifs assistés par ventilateur et de pulvérisateurs à main ou à dos conçus pour la pulvérisation aérienne. Pulvériser dans l'air autour des zones à traiter en accordant une attention particulière aux endroits où les insectes se reposent et se reproduisent ou leurs zones de prédilection. Fermer les fenêtres et les portes avant d'appliquer le produit et les garder fermées pendant au moins une heure. Couper l'électricité et l'air conditionné. Tenir à l'écart tous les animaux et toutes les personnes pendant l'application. Adapter l'application au moment où l'insecte cible est le plus actif. Après l'application, aérer la zone traitée pendant au moins 4 heures ou utiliser un ventilateur (taux de 1200 m<sup>3</sup>/h) pour ventiler les pièces. Avant de pénétrer dans la zone traitée, s'assurer que le brouillard est complètement séché. Portez des gants, ne respirez pas les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Sinon, portez une protection faciale complète avec un masque respiratoire auto-ventilé et une protection oculaire. Une protection respiratoire est recommandée lors de la rentrée après la brumisation

**Précautions:** Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors du stockage ou de l'élimination. Conserver dans le récipient d'origine, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Interdire à toutes personnes d'entrer dans la zone traitée tant que le produit n'a pas séché et que les lieux n'ont pas été aérés. Retirer les aquariums ou les ouvrir avant d'utiliser le produit. **Ne pas faire d'application spatiale** dans les zones où des animaux domestiques sont présents dans l'établissement. Laissez les surfaces traitées sécher complètement avant de permettre aux animaux de revenir.

**Premiers secours:** En cas de doubleurs persistantes appeler un médecin. Enlever les vêtements contaminés.

**Inhalation:** éloigner de la zone de danger les personnes contaminées par le produit. Assurer un apport d'air frais

**Contact cutané:** laver immédiatement avec de l'eau et du savon

**Contact oculaire:** Enlever les lentilles de contact. Rincer soigneusement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes, les paupières bien écartées et en protégeant l'œil non affecté

**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement le médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de détresse aigue contacter le 15 ou un centre antipoison (ORFILA/ INRS 0145429599)

**Nettoyage du matériel et élimination du produit:** Après traitement, rincer le matériel avec de l'eau et traiter ce résidu comme un déchet industriel dangereux, ainsi que l'emballage vide et les restes éventuels. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne jeter aucun résidu dans les égouts ou cours d'eau

**Distribué par :**

KILLGERM FRANCE. 430 rue de l'Avenir,  
69830 Saint-Georges-de-Reineis  
Tel: +33 (0)4 74 06 17 20