

EFFICACITÉ

FENOX EC est destiné à la lutte contre les insectes nuisibles en hygiène générale et dans les milieux de l'élevage et du stockage des produits POA et POV transformés (punaises de lit, blattes germaniques, fourmis, mouches, moustiques, triboliums, pyrales des fruits secs (*Plodia interpunctella*), capucins, lasiodermes, dermestes, charançons...). Les insectes sont tous abattus en moins d'une heure et les surfaces sont protégées pendant 3 mois. Retraiter en cas de nouvelle infestation et avant toute entrée d'animaux dans le cadre de l'élevage. Ne pas dépasser une application tous les 3 mois.

PRÉCAUTIONS

Bien agiter le flacon avant emploi. Evacuer les personnes, les animaux (y compris les aquariums et les terrariums) et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Retirer la nourriture et les aliments pour animaux de la zone à traiter. Ne pas appliquer sur les surfaces où la nourriture est manipulée, préparée, servie ou consommée. Prenez garde au matériel informatique et aux surfaces sensibles, par mesure de précaution, faire un essai avant d'effectuer la totalité du traitement. Ne pas pulvériser sur les personnes, les aliments, les animaux. Dans le cas d'un traitement de volume d'un local contenant des denrées emballées, l'utilisateur prend toutes les mesures appropriées pour éviter la contamination des denrées emballées. Il est conseillé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation. Bien nettoyer le matériel utilisé après chaque application. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Conserver hors de portée des enfants et animaux domestiques. Conserver dans le récipient d'origine, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du gel. Ne pas réutiliser l'emballage. L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

FENOX EC - Etofenprox (Cas : 80844-07-1) 300 g/L - Pyréthre (Cas : 8003-34-7) 1g/L

Attention

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P260 Ne pas respirer les poussières ou brouillards. P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

LODI - Parc d'Activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray
Tél. 02 99 08 48 59 - www.lodi.fr

Numéro de lot et date de péremption : voir sur l'emballage.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande.

L
LODIGROUP
500mL



E-51728



CONCENTRÉ
LIQUIDE
ÉMULSIONNABLE
INSECTICIDE
ACARICIDE

CHOC &
REMANENCE



PHOBI
Fenox
EC

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL
Hygiène générale - Élevage
Locaux POA/POV - Denrées emballées
Ordures et déchets - Tabac - Usages biocides

**INSECTES VOLANTS,
RAMPANTS, ACARIENS...**

MODE D'EMPLOI

Pulvérisation de surfaces :

Pulvériser le produit après l'avoir dilué dans l'eau à la dose préconisée (voir tableau). Pulvériser tous les endroits fréquentés par les insectes (murs, sols, encadrements de fenêtres, tapis, matériels, litères...).

Aérer pendant tout le traitement puis ventiler à fond avant de réoccuper les lieux pendant 30min à 2h selon le niveau de ventilation.

Traitement de volumes et spatial :

Afin d'obtenir une efficacité optimale du produit, fermer toutes les issues de la zone ou du local à traiter (portes, portails, fenêtres et autres ouvertures...). Arrêter les ventilations internes ou les soufflages/extractions pendant le traitement. Colmater les ouvertures et sources de fuite. Nébuliser le produit à la dose préconisée (voir tableau). Diluer dans l'eau si besoin, selon le type d'appareil utilisé. Quitter la zone traitée et laisser agir 4 à 6h pour une efficacité optimale. Ventiler à fond avant de réoccuper les lieux (durée d'aération variable selon le niveau de ventilation et la taille du local : 30min à 2h).

Comme pour tout traitement de volume, le port de la combinaison intégrale jetable, d'un masque panoramique, de gants et de bottes est obligatoire. Pour une efficacité optimale, respecter les dilutions et les doses d'emploi.

Dans les locaux d'élevage, bien insister dans les angles et autour des ouvertures des bâtiments. Pour une utilisation sur les chaînes de transformation et fabrication industrielles en IAA, bâcher hermétiquement toutes les installations. Après le traitement, rincer toutes les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires. Après le traitement, rincer toutes les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires.

DOSES D'EMPLOI

	TRAITEMENT DE SURFACES /100M ²	TRAITEMENT DE VOLUMES /1000M ³
HYGIÈNE GÉNÉRALE		
Moustiques	50mL dans 5L d'eau	50mL 30 à 60mL / 1Ha
Autres insectes	50mL dans 5L d'eau	200mL

LOCAUX DE STOCKAGE, IAA, BOULANGERIES, SUPERMARCHÉS, ABATTOIRS...

Locaux de stockage POA/POV	50mL	
Locaux contenant des denrées emballées POA / POV	50mL	200mL 400mL en cas d'infestation de blattes
Matériel de transport POA/POV et de stockage POV	50mL	

ÉLEVAGE

Logements d'animaux domestiques	50mL	
Matériel d'élevage	50mL	
Matériel de transport d'animaux domestiques	50mL	
Locaux de préparation de nourriture	50mL	

ORDURES ET DÉCHETS, LOCAUX DOUBELLES, DÉCHETTERIES, VIDE-ORDURES, CAMIONS BENNES...

Locaux utilisés pour le traitement	50mL	
Matériel de collecte	50mL	
Matériel de transport	50mL	

(Détenteur : LODI S. A. S. - 35390 GRAND-FOUGERAY)