

Rentokil



Brodifacoum 25 paste

Brodifacoum 25 paste

Présentation

Ce produit contient une pâte moelleuse riche en graisse à base de Brodifacoum 25 ppm.

Le Brodifacoum est un anticoagulant de seconde génération provoquant des troubles de la coagulation et entraînant ainsi la mort du rongeur. Le décès a lieu quelques jours après l'ingestion, la mort des rongeurs paraît naturelle et n'éveille aucune méfiance chez leurs congénères.

Le produit est à placer dans des boîtes à appâts sécurisées.

Cet appât pour rongeur est pratique et sans risque de dispersion avec une acceptation rapide par les rongeurs.

Propriétés

- Convient à tous types de rongeurs : rat brun, rat noir, souris domestique
- Lieux d'utilisation : intérieur et autour des bâtiments
- Excellente appétence et efficace dans des situation de concurrence alimentaire
- Ne nécessite qu'une seule dose pour provoquer la mort
- Sans risque de dispersion

Brodifacoum 25 paste

Caractéristiques techniques

Type de produit :

Rodenticide – biocide TP14

Type de formulation :

Appât en pâte

Substance active :

Brodifacoum

Concentration :

0,0025%

Contenance :

Cartouche de 300 g

N° d'AMM :

FR-2022-0035-02-01

Conservation :

24 mois après la date de fabrication

Conditions d'emploi

Réservé exclusivement à un usage professionnel.

- Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés et/ou points d'appâts couverts et protégés.

Dose contre les rats : jusqu'à 200 g de produit par point d'appâts espacés de 5 à 10 mètres.

Dose contre les souris : jusqu'à 50 g de produit par point d'appâts espacés de 5 à 10 mètres.

Inspecter les postes après 2 à 3 jours pour les souris ou 5 à 7 jours pour les rats afin de vérifier que l'appât est accepté, puis une fois par semaine.

Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

- **Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives** (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- **Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire**, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- **Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent** pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- **Porter des gants nitrile jetables** lors de l'application du produit, de la manipulation des postes et du retrait des cadavres.

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été consommé ainsi que l'emballage vide, dans un circuit de collecte approprié.